

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ**

TUSAL[®]



**ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**



**ΣΥΝΘΕΣΗ TRICHODERMA ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΑΤ**

αρ. έγκρισης: 60566



**ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**



**ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ**



**ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
(*Phytophthora sp.*, *Rhizoctonia sp.*,
Fusarium sp., *Sclerotinia sp.*, κ.α.)**



ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ



Timac AGRO



ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ


1 ΑΜΥΝΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ:

Η ταχεία ανάπτυξη και εγκατάσταση του TUSAL στο έδαφος εξασφαλίζει τον αποικισμό των ριζών και εκτοπίζει φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς.

ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ:

Αποτρέπει την επαφή φυτού - παθογόνου αναστέλλοντας παράλληλα τα ένζυμα εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον αποικισμό.




2 ΕΠΙΘΕΣΗ

ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ:

Το TUSAL απελευθερώνει ουσίες, ένζυμα και δευτερογενείς μεταβολίτες με αντιβιοτική δράση που αναστέλλουν την ανάπτυξη και προκαλούν το θάνατο του παθογόνου.

ΜΥΚΟΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ: Το TUSAL εντοπίζει, επιτίθεται και καταστρέφει διαφορετικά είδη φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών, ακολουθώντας, συσπείρωση και διάτρηση των κυτταρικών τους τοιχωμάτων για να τα παρασιτηήσει και εξοντώσει.



ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΦΥΤΟ

3



ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ:

Το TUSAL επάγει την αντίσταση των φυτών ενάντια στα βιοτικά στρες.


ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΙΖΑΣ:

Το TUSAL αυξάνει τον όγκο και το εύρος των ριζών, ευνοώντας την απορρόφηση θρεπτικών ουσιών και νερού, και κατά συνέπεια την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα.



TUSAL®

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ



ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

- Εγκεκριμένο κατά του πύθιου, της ριζοκτόνιας, της σκληρωτινίασης, των φουζαρίων, της φυτόφθορας κ.α.
- Συμβατό με αμινοξέα, μυκόριζες, PGRPs
- 2 διαφορετικά στελέχη τριχοδέρματος με αποδεδειγμένη συνεργιστική δράση
- Εύκολο στη χρήση και την εφαρμογή (στάγδην, εμβάπτιση, ψεκασμός)



Στάγδην άρδευση
50-100gr/στρ.



Βύθιση φυτωρίων ή
μοσχευμάτων
2 g/L νερού



Ψεκασμός πριν από τη
σπορά 0,5-1 g/m² de
δίσκοι 50-100gr/στρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.